

予防接種とは

病気に対する抵抗力（免疫）を作るものです。

赤ちゃんはお腹の中で、お母さんからある程度の抵抗力をプレゼントされますが、百日せきでは生後3ヶ月頃まで、また麻疹（はしか）や、おたふくかぜでは、生後8ヶ月から10ヶ月頃までに自然になくなります。これに役立つのが予防接種です。

予防接種は、病気を予防したり病気にかかっても軽い症状ですむこともあります。

集団に入ると病気にかかる機会が多くなりますのでその前に終わらせておきましょう。

予防接種の種類と受け方

		3ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	24ヶ月	36ヶ月	48ヶ月	90ヶ月	12歳	13歳	
個別で行う予防接種 場所：指定医療機関▼右記表参照	3種混合 (百日せき・ジフテリア・破傷風)	← 初回 第1期		← 第1期追加					小6 ← 第2期		
		生後3～90ヶ月(7歳6ヶ月)未満 [第1期] 初回：3～8週間の間隔で3回接種 追加：初回の3回目終了後12～18ヶ月の間に1回接種 [第2期] (二種混合)：11歳～12歳の間に1回接種									
集団で行う予防接種 場所：保健センター▼予約制	麻疹風疹混合予防接種	I期：生後12～24ヶ月未満 II期：就学前1年 III期：中学1年(平成24年度まで) IV期：高校3年(平成24年度まで)									
	ポリオ (小児マヒ)	生後3～90ヶ月(7歳6ヶ月)未満の間に6週間以上あけて2回接種									
	BCG(結核)	生後3～6ヶ月未満									

最も適した年齢 受けることのできる年齢

予防接種指定医療機関	
青沼医院	潮見8丁目5-5 TEL: 44-2277
網走厚生病院	北6条西1丁目 TEL: 43-3157
角谷こどもクリニック	潮見5丁目120-5 TEL: 61-2332
金川医院	南2条西2丁目 TEL: 43-2884
こが病院	潮見153-1 TEL: 61-0101
つくしヶ丘医院	つくしヶ丘5丁目10-14 TEL: 44-1181
中山医院	南2条西1丁目 TEL: 44-7227


※指定医療機関の曜日、時間等の詳しいことは、健康カレンダー(みんなの健康)、広報などでご確認ください。

※また、わからないことや相談したいことがあれば、保健センターまでご連絡ください。

接種の間隔は？

ワクチンを続けて接種する場合は、その効果、安全性のため、下記の間隔をあけて接種してください。

ちがう種類のワクチンを続けて接種する場合の間隔



同一ワクチンを続けて接種する場合の間隔

